



જીલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU)



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS)
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી
અમદેલી-૩૬૫૬૦૧

કુન્ડનં. ૦૨૭૯૮૨ ૨૨૭૭૧૨૨

(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)

આનંદી
કા
અમૃત મહોત્સવ

#AmritMahotsav



અહીં ક્લિક કરી કૃષિ હવામાન બુલેટીન અંગે આપના પ્રતિભાવ અવશ્ય જણાવો



અમદેલી જીલ્લાના તાલુકાઓ મુજબની હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ માટે ટેલીગ્રામ અથવા
વોટ્સઅપ ગુપ્ટમાં જોડાવા અંતિમ પેઝની મુલાકાત લો



અમદેલી કૃષિ હવામાન બુલેટીન ક. ૦૭૦/૨૦૨૩

તા. ૦૫-૦૬-૨૦૨૩

પાછલા અઠવાડીયાનું અમદેલીનું હવામાન

#	હવામાન પરિબળો	30-08-23	31-08-23	01-09-23	02-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23
૧	વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૨	મહત્તમ તાપમાન (°સે.)	૩૪.૭	૩૪.૭	૩૪.૨	૩૪.૧	૩૩.૬	૩૩.૭	૩૨.૬
૩	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.)	૨૪.૮	૨૪.૬	૨૪.૯	૨૪.૬	૨૪.૧	૨૪.૮	૨૪.૮
૪	મહત્તમ બેજ સવાર (%)	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૯૨
૫	લઘુત્તમ બેજ બાપોર (%)	૪૩	૪૮	૫૦	૫૩	૫૦	૫૦	૫૪
૬	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૯.૮	૯.૧	૭.૮	૮.૯	૯.૦	૧૦.૭	૧૦.૧
૭	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટોબર) માંથી	૧	૨	૩	૦	૨	૧	૨

અમદેલી જીલ્લાની તા. ૦૬/૦૯/૨૦૨૩ થી ૧૦/૦૯/૨૦૨૩ ની હવામાન આગાહી:

#	હવામાન પરિબળો	૦૬/૦૯/૨૦૨૩	૦૭/૦૯/૨૦૨૩	૦૮/૦૯/૨૦૨૩	૦૯/૦૯/૨૦૨૩	૧૦/૦૯/૨૦૨૩
૧	વરસાદ (મી.મી.)	૧	૨	૮	૩	૫
૨	મહત્તમ તાપમાન (°સે.)	૩૫	૩૫	૩૪	૩૪	૩૨
૩	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.)	૨૫	૨૫	૨૫	૨૬	૨૫
૪	મહત્તમ બેજ સવાર (%)	૮૪	૭૭	૭૯	૮૧	૮૫
૫	લઘુત્તમ બેજ બાપોર (%)	૪૮	૪૨	૪૪	૪૮	૫૬
૬	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	૧૭	૨૧	૨૩	૨૪	૨૩
૭	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૮૩	૨૯૨	૨૯૨	૨૮૮	૨૮૮
૮	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટોબર) માંથી	૪	૬	૭	૮	૭

નોંધ: આ આગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નહિ.

હવામાન સારાંશ અમદેલી જીલ્લામાં આગામી પ દિવસ દરમિયાન હવામાન આંશિક બેજવાળું અને આંશિક વાદળાથું રહેવાની શક્યતા છે. મહત્તમ ૩૨-૩૫ °સે અને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૫-૨૬ °સે જેટલું રહેવાની શક્યતા છે.
તા. ૦૬-૧૦ સાટેમ્બર દરમિયાન છુટા છવાયા હળવા વરસાદની શક્યતા છે. મહત્તમ પવનની ગતિ સામાન્ય, અંદાજીત ૧૭-૨૪ કિમી/કલાક સુધી ની રહેવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા પશ્ચિમ-વાયવ્ય રહેવાની શક્યતા છે.

આગોતરં અનુમાન: તા. ૧૧ થી ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રમાં છુટા છવાયા વિસ્તારોમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન ૩૪-૩૬ °સે અને લઘુત્તમ તાપમાન ૨૪-૨૬ °સે રહેવાની શક્યતા છે.

- સામાન્ય કૃષિ સલાહ**
- વરસાદની ઓછી માત્રા ને કારણે કોઈ પાક નિષ્ઠળ ગયો હોય તો તે જમીનમાં ગુવાર, મગ, અડદ, તુવેર, દિવેલા, પૂર્વા- તલ, અર્ધ શિયાળું તુંગાળી, અર્ધશોયાળું બાજરી, બીજ માટે શાણ તથા ધાસચારાના પાક જુવાર, ચોળી, સૂર્યમુખીનું વાવેતર કરી શકાય.
 - ચોમાસું પાકોને ફુવારા અને ટપક પદ્ધતી દ્વારા પિયત આપવું.
 - આંતરખેડ કરવી તેમજ તેમાંનું નિંદણ દૂર કરી તેનો અચ્છાદન (મલ્ચીંગ) તરીકે ઉપયોગ કરવો, નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરનો ફૂલીઅર સ્પ્રે કરવો.
 - જમીનજન્ય રોગ, મગફળીમાં સફેદકૂગનો સુકારો, કપાસનો સુકારો, મૂળખાઈ રોગના નિયંત્રણ માટે ટ્રાઇકોર્માં ફૂગનો પાઉડર હેકટરે ૨.૫ કીલો વાપરવો. રોગનો ઉપદ્રવ વધારે હોય તો કાબેન્ડાર્ઝીમ ૦.૦૫ % ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી મિશ્રણ કરી મૂળ વિસ્તારમાં રેડવું (ડ્રિન્ચિંગ કરવું).
 - ઉત્સેદન ઘટાડવા (પાણીને પર્ઝમાંથી જતું અટકાવવા) માટે કેઓલીન ૪૦૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો




- ઓછા વરસાદને કારણે જમીનમાં બેજ જાળવણી માટે ઘેતીના વિવિધ કચરા અથવા ખાસ્ટીકનું આચ્છાદન/આવરણ/મલ્ચીંગ કરવું, મલ્ચીંગ કરવાથી જમીનમાં બેજ સરંક્ષણ ઉપરાંત નિયંત્રણ પણ કરી શકાય છે.
- કપાસમાં ગુલાબી ઈયળની મોજણી માટે પ્રતિ એકટે બે ફેરોમેન ટ્રેપ (લ્યુર સાથે) લગાડવા, રોજ ફૂદાની સંખ્યા તપાસવી અને સતત ૩ દિવસ સુધી સરેરાશ ૮ નર ફૂદા પકડાય તો લીંબોળીના મીજ ૫% અથવા લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લિટર છંટકાવ કરવો.
- વાદળિયાં વાતાવરણને લીધે ચુસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાની લીંબોળીની મીજનો ભૂકો ૭૫૦ ગ્રામ (૫ ટકા અર્ડ્ઝ) અથવા લીંબોળીનું તેલ ૪૫ મિ.લિ. અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર કીટનાશક ૩૦ મિ.લિ. (૧ ઇસી) થી ૬૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇસી) પ્રતિ પંપ પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો.

SMS	→ કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઈયળના ઉપદ્રવથી બચવા હેકટરે ૪૦ ફેરોમોન ટ્રેપ લગાવવી તેમજ બ્યુવેરીયા બેરીયાના ૮૦ ગ્રામ/પંપમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરો.
------------	--

પાક મુજબ કૃષિ સલાહ

પાક	પાક અવસ્થા	કમાળીસી / જાત / રોગ / જીવાત	કૃષિ સલાહ
અર્દ્ધા	લશકરી ઈયળ અને ધોડીયા ઈયળ		લશકરી ઈયળ અને ધોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે કલોરન્ટનીલપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી ૩ મિલી અથવા ઇન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫% એસસી ૫ મિલી અથવા એમામેક્ટીન બેન્કોએટ ૫% ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ અથવા સ્પીનોસાડ ૪૫ એસસી ૨ મિલી ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

ચુસીયા પ્રકારની જીવાતો		• તડતડીયા, શ્રીએ અને સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં
-------------------------------	--	--

			<p>લીબોળીની મીજ ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લી. અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર કીટનાશકનો ૧૦ મિ.લી. (૫ ઇસી) થી ૫૦ મ.લી. (૦.૦૩ ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ફ્લોનીકામાઈડ ૫૦ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ, થાયકલોપ્રિડ ૪૮ એસસી ૫ મિ.લી અથવા ડાયહેન્થ્યૂરોન ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ અથવા ડીનોટેક્ષ્યૂરાન ૨૦ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા કલોથીઆનિડીન ૫૦ ડબલ્યુડીજી ૪ ગ્રામ અથવા ફ્રીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લી અથવા એસીફેટ ૫૦%+ ઇમિડાકલોપ્રિડ ૧.૮% એસપી ૧૦ મિ.લી પ્રતિ ૧૦ લિટરપાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 	
કપાસ	વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ થી ચાબખા અવસ્થા	ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> પાનકોરીયાના નિયંત્રણ માટે સ્પીનોસાડ ૪૫ એસસી ૩ મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ ઓડોડી ૨૦ મીલિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. 	
		વૃદ્ધિ વર્ધક	<ul style="list-style-type: none"> કપાસમાં પાણા ચડાવતી વખતે પપ ડિ.ગ્રા. DAP અને ૧૨૫ ડિ.ગ્રા. મ્યુઝેટ ઓફ પોટાસ પ્રતિ હેક્ટર આપવું એમોનિયમ સલ્ફેટ ૩૪ ડિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર વાવેતર બાદ ના ત્રીજા અઠવાડિયે આપવું. 	
	ચુસીયા પ્રકારની જીવતો			
	ગુલાબી ઈયળ		 ઈયળ  ઇયળ  ઇયળ  ગ્રોગો	<ul style="list-style-type: none"> તડતડીયા, શ્રીપ્સ અને સહેદ માખીના નિયંત્રણ માટે ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીબોળીની મીજ ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લી. અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર કીટનાશકનો ૧૦ મિ.લી. (૫ ઇસી) થી ૫૦ મ.લી. (૦.૦૩ ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ફ્લોનીકામાઈડ ૫૦ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ અથવા ડાયહેન્થ્યૂરોન ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ અથવા ડીનોટેક્ષ્યૂરાન ૨૦ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા કલોથીઆનિડીન ૫૦ ડબલ્યુડીજી ૪ ગ્રામ અથવા ફ્રીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લી અથવા એસીફેટ ૫૦%+ ઇમિડાકલોપ્રિડ ૧.૮% એસપી ૧૦ મિ.લી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

• ગુલાબી ઈયળના સંપૂર્ણ સંકલિત નિયંત્રણની માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

	ખૂણિયા ટપકાં		<ul style="list-style-type: none"> • ૧ ગ્રામ સ્ટ્રેટોમાયસીન સલ્ફેટ + ૪૦ ગ્રામ કોપર ઓક્સિક્રોરાઇડ ૫૦ વેપા ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
	મૂળખાઈ/ મૂળનો સડો		<ul style="list-style-type: none"> • કાર્બન્ડાજીમ ૧૦ પ ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્સિક્રોરાઇડ ૨૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેજવી સૂક્તા છોડની આજુબાજુ જમીનમાં મૂળ વિસ્તારમાં આપવું.
	મોલો-મશી, શ્રોષા, સફેદમાખી, તડતડીયા:		<ul style="list-style-type: none"> • જુવો, એરંડા/દિવેલા માં ચુસીયા પ્રકારની જીવાતો.
મગફળી (ચોમાસુ)	કુલ થી સુચા અને ડોડવા બંધાવવાની અવસ્થા	પાનના ટપકાનો રોગ	<ul style="list-style-type: none"> • પાનના ટપકાના રોગના આંગોતરા નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ અથવા ટેબુકોનાઝોલ દવા ૧૬ મીલી પ્રતિ પંપમાં નાખી વરાપે છંટકાવ કરવો.
		સફેદ ઘૈણા/ મુંડા	<ul style="list-style-type: none"> • ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં પ્રકાશ પિંજર પ્રતિ હેક્ટારે એકની સંખ્યામાં ગોઠવી તેમાં આકષ્માયેલ ઢાલિયા તેમજ પાન ખાનાર ઈયળના કુંદાનો નાશ કરવો. • ઊભા પાકમાં ઉપદ્રવ જણાય તો ક્લિનાલફોસ ૨૦ ઈસી હેક્ટારે ૪ લિટર પ્રમાણો પિયતના પાણી સાથે ટીપે ટીપે આપી શકાય. જો પિયત આપવાનું થતું ન હોય અને સમાચારાંતરે વરસાદ પડતો હોય તો કીટનાશક છાંટવાના પંપમાં દ્રાવણ ભરી તેની નોઝલ કાઢી લઈ ચાસમાં પુરતા પ્રમાણમાં આપવી.
બાજરો (ચોમાસુ)	વાયેતર થી બીજોકુરણ	નિદામણ	<ul style="list-style-type: none"> • બાજરીના પાકને ૪૫ દિવસ સુધી નીદામુક્ત રાખવો. બાજરીના પાકને નીદામુક્ત રાખવા તથા જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખવા માટે બે થી ત્રણ વખત આંતરખેડ કરવી જરૂરી.
		ખાતર	<ul style="list-style-type: none"> • ચોમાસું બાજરી ઉગાડતા ખેડૂતોને સારી વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ, વધુ ઉત્પાદન અને ચોમ્પી આવક મેળવવા માટે વાવણી બાદ ૩૦-૩૫ અને ૫૦-૫૫ દિવસે પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ ૧.૫ ટકા નાં દરે (૭.૫ કી.ગ્રા./હે. ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ને) છંટકાવ કરવો.
		વૃદ્ધિ	<ul style="list-style-type: none"> • ચોમાસું બાજરી ઉગાડતા ખેડૂતોને સારી વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ, વધુ ઉત્પાદન અને ચોમ્પી આવક મેળવવા માટે વાવણી બાદ ૩૦-૩૫ અને ૫૦-૫૫ દિવસે પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ ૧.૫ ટકા નાં દરે (૭.૫ કી.ગ્રા./હે. ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ને) છંટકાવ કરવો.
		પાનનાં ટપકા/બ્લાસ્ટ	<ul style="list-style-type: none"> • રોગની શરૂઆત થાવ ત્યારે, કાર્બન્ડાજીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી, બે છંટકાવ ૧૫-૨૦ દિવસના ગાળે કરવા.
તલ (ચોમાસુ)	વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ	કોકડવા	<ul style="list-style-type: none"> • તલમાં કોકડવા મોટેભાગે કથીરી અથવા પાન વાળનાર ઈયળને લીધે થાય છે, કથીરીના નિયંત્રણ માટે ફેનપાયરોક્ષીમેટ ૫% ઈસી ૧૫ મિલી, અને કથીરી તેમજ પાનવાળનાર ઈયળ બંનેનો પ્રશ્ન હોય તો થાયોડીકાર્બ ૭૫% વેપા ૧૫ ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.

	થડ અને મૂળનો સુકારો	<ul style="list-style-type: none"> કાનેન્ટાજીમ ૦.૦૫ % ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી મિશ્રણ કરી મૂળ વિસ્તારમાં રેડવું (ડ્રાઇંગ કરવું). 	  	
	પાર્સ્લીચ/ ફાયલોડી		<ul style="list-style-type: none"> આ રોગ લીલાં તડતડીયાંથી ફેલાતો હોઈ, સૌપ્રથમ તો રોગીએ છોડને ખેંચી ને તેનો નાશ કરવો અને ત્યારબાદ લીલાં તડતડીયાંના નિયંત્રણ માટે ડાયમિથોઓટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ ૧૦ લિટરમાં ભેણવી ૧૦ દિવસના અંતરે બે થી નણ છંટકાવ કરવા. 	
	માથા બાંધનારી ઇથળ	<ul style="list-style-type: none"> પ્રકાશ પિંજર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઈથળના ફૂદાંનીવસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરોયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ અથવા લીબોળીની મીજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેણવી જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં છંટકાવ કરવો. કિવનાલફોસ રૂપ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા કલોશપાથીફોસ ૨૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા એક્સિક્ટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં મેળવી છંટકાવ કરવો. 		
તુવેર	વાવેતર થી બીજોકુરણ	નિદામણ	<ul style="list-style-type: none"> જરૂર મુજબ આંતરખેડ અને નિદામણથી ખેતર ચોખ્યુ રાખવું. જો ખેતમજુરોની અછત હોય તો રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે પેનીમીથીલીન (સ્ટોમ્પ) હેકટરે ૧ કિ.ગ્રા. સક્કિય તત્ત્વ ૬૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને છાટવાથી નિદામણ નિયંત્રણ થાય છે. આ દવા વાવેતર બાદ તુરતજ ઉગાવો થાય તે પહેલા છાંટવી. 	
મગ/અડા	વાવેતર થી બીજોકુરણ	પીળો પચરંગીયો	 <ul style="list-style-type: none"> આ રોગનું વહન સહેદમાણી દ્વારા થાય છે, જેના નિયંત્રણ માટે શોષકપ્રકારની કીટનાશકો જેવી કે ડાયમિથોઓટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ઇમિડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૩ મિ.લિ. અથવા એસીટામિપ્રિડ ૨૦ એસપી ૨ ગ્રામ અથવા એઝાઈસીટીન ૪૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી જરૂરીયાત મુજબ છંટકાવ કરવો. 	
		કાલપ્રાણા		<ul style="list-style-type: none"> બાબા પાકમાં રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાજીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેણવી છંટકાવ કરવો
		પાનનો સૂકારો/ મેઇટીસ લીફ જ્લાઇટ		<ul style="list-style-type: none"> ટેબૂકોનાઝોલ રૂપ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ રૂપ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા મેનોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેણવી છંટકાવ કરવો અથવા ૧૦ % ગૌમૂત્ર (૧ લીટર પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણી) અથવા લીમડાના પાનનો ૧૦ % અર્કનો જરૂરિયાત મુજબ છંટકાવ કરવો.
જુવાર	વાવેતર થી બીજોકુરણ	કાલપ્રાણા/ પાનના ટપકાં		<ul style="list-style-type: none"> કાર્બેન્ડાજીમ ૫૦ વેપા ૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.
શેરડી		પાક સંરક્ષણા	<ul style="list-style-type: none"> શેરડી નો વધુ ઉતારો લેવા તેમજ ખાડ ની ટકાવારી લેવા રોપણી બાદ ૬, ૭ અને ૮ મહિને એમ ત્રણ વખત ૨૫% પણ્ણો (શેરડીના સાંચા ઉપસના કુલ પણ્ણો ના નોંધે થી ચોથા ભાગના સુકાયેલા પણ્ણો) કાઢી ખેતરમાં જ આવરણ તરીકે ઉપયોગ કરવો. શેરડીના પાન કાઢી નાખવાથી ભીગડાવાળી જુવાત, ચીકટો વગેરે જુવાતોનું તેના કુદરતી દુશ્મનો દ્વારા અસરકારક નિયંત્રણ થઈ શકે છે. 	

ટમેટો		<ul style="list-style-type: none"> પાનકોરીયાના નિયંત્રણ માટે સ્પીનોસાડ રૂપ એસસી ૩ મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૨૦ મીલિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. 	
રીગાણ		<ul style="list-style-type: none"> પાનકોરીયાના નિયંત્રણ માટે સ્પીનોસાડ રૂપ એસસી ૩ મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૨૦ મીલિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. 	
કુદી		<ul style="list-style-type: none"> પાનકોરીયાના નિયંત્રણ માટે સ્પીનોસાડ રૂપ એસસી ૩ મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૨૦ મીલિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. 	
શાકભાજુ	ધંન ઉછેર/રોપણી વાવેતર	<ul style="list-style-type: none"> મરચી, ટમેટો, રીગાણ, અને કોબીઝુના ધંન તૈયાર કરવા (ગ્રીન શેડ નેટમાં અને નેટની ડીચાઈ ડ.પ કૂટ રાખવી) ગારી ક્યારા બનાવી તેમાં બીજાનું વાવેતર કરવું. ધંન તૈયાર હોય તો ફેર રોપણી કરવી. જમીન જન્ય ફૂગનો ઉપદ્રવ ના થાય તે માટે બીજને મેન્કોઝેબ અથવા થાયરમ અથવા વીટાવેક્ષ પૈકી કોઈ એક દવાનો ૨-૨.૫ ગ્રામ પ્રતિ કિલ્વો બીજ મુજબ પટ આપવો. તેમજ વાવેતર બાદ ૧૦-૧૫ દિવસે મેન્કોઝેબ ૭૫ % વે.પા.નું ૨.૫ ગ્રામ પ્રતિ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ધરના ક્યારામાં ડ્રેન્ચિંગ કરવું જેથી સુકારો ના આવે. 	
	ધરુ મૃત્યુ/ ધરુનો કોહવારો	 <ul style="list-style-type: none"> રોગ દેખાય ત્યારે એઝોક્સિસ્ટ્રોભીન ૨૩ એસસી ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણી અથવા ફેનામીડોન ૧૦% + મેન્કોઝેબ ૫૦% વેપા ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીનો છંટકાવ કરવો અથવા મેટાલેક્ષિલ એમેઝેડ ડલ વેપા ૨૦૦ લિટર પાણીમાં તર ગ્રામ મુજબ ઓગાળી એક ગુંડા વિસ્તારમાં જારાથી રેડવું અથવા બોર્ડો મિશ્રણનું દ્રાવણ જારાની મદદથી પ્રતિ ચોરસ મીટરે ૨ લીટર મુજબ આપવું. 	
	કોકડવા	 <ul style="list-style-type: none"> રોગનો ફેલાવો સંક્રદમાખીથી થતો હોઈ તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં પાયરીપોક્ષીફીન ૧૦ ઇસી ૧૬.૬૭ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી તેમજ ટામેટીના પાકમાં સાયાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦.૨૬ ઓડી ૧૮ મિ.લિ. અથવા ડાયમિથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા સ્પાયરોમેસીફીન ૨૨.૮ એસસી ૨૮.૫ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૨૫ ઉભયુંજી ૪ ગ્રામ અથવા ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૧.૮ એસસેલ ૩ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. 	
લીંબુ	ફળ અવસ્થા/ કૂલ અવસ્થા	બળિયા ટપકા	<ul style="list-style-type: none"> બળિયા ટપકા ના નિયંત્રણ માટે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર, ફેલુઆરી-માર્ચ, જુન અને જુલાઈ-ઓગસ્ટ માં એમ કૂલ ચાર વખત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના પ્રમાણ વાળું બોર્ડો મિશ્રણ અથવા તાંબા ચુક્ત દવાનો છંટકાવ કરવો.
		ફળ ખરી જવા	<ul style="list-style-type: none"> લીંબુ ના ફળો બેસી ગયા બાદ ૨% યુરિયા સાથે ૨૦ ppm NAA ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી ફળ નું ખરણ ઘટે છે અને ફળ ના કાળ અને વજન માં વધારો થાય છે.
		ગુંદરિયો	<ul style="list-style-type: none"> જમીનને અડકતી ડાળીઓની છટાણી કરી બાળી નાખવી. થાને પાણીનો સીધો સંપર્ક ન થાય તે માટે થડ પર બોર્ડો પેસ્ટ (મોરથુથ ૧ કિ.ગ્રા., કલીચૂનો ૧ કિ.ગ્રા. ૧૦ લિટર પાણીમાં) લગાવી થડની ફુરતે માટી ચડાવવી. અસરગ્રસ્ત ઝડના થડ ફુરતે મેટાલેક્ષિલ એમેઝેડ ૭૨ વેપા (૨૫ ગ્રામ/૧૦ લિટર) નું ડ્રેન્ચિંગ કરવું.
		સાયલા	<ul style="list-style-type: none"> ઉપદ્રવિત અને સુકી ડાળીઓ કાપતા રેહવું. ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીબોળીના મીજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડા / નફ્ટાટીયાના પાન ૧ કિલોગ્રામ અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર કરેલ કીટનાશક ૫ ઇસી - ૧૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો.
		અને શ્રીપ્રક્ષ	<ul style="list-style-type: none"> નર્સરીમાં રોપાઓ ઉપસની તથા ૪ બગીચામાંથી ઇંયળોનો હાથથી વીણિને નાશ કરવો. ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીબોળીની મીજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫ % અર્ક) ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવીને છંટકાવ કરવો.

પશુપાલન 	<ul style="list-style-type: none"> • કિવનાલફોસ, રૂપ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાલીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. • લીભુમાં નવી ફૂટ નીકળતી હોય ત્યારે છટણી કરવી નહીં. • વાર્ષિક નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરો આપવા નહીં. • ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. અથવા લીમડા અધારિત તૈયાર કોટનાશક ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઈસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઈસી) અથવા લીમડાનો ખોળ ૧ ડિ.ગ્રા. ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. • ડાયમીથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા એસીફેટ ૭૫ એસીપી ૧૦ ગ્રામ અથવા કિવનાલફોસ રૂપ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ફેનવાલરેટ ૨૦ ઈસી ૫ મિ.લિ. અથવા સાયપરમેશ્વિન ૨૫ ઈસી ૪ મિ.લિ. અથવા તેલટમેશ્વિન ૨.૮ ઈશી ૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવીને છંટકાવ કરવો. જરૂર જણાય તો ૧૫ દિવસ બાદ બીજો છંટકાવ કરવો.
જીવત નિયંત્રણ	<ul style="list-style-type: none"> • પશુઓમાં બાજ્ય પરોપજીવીના નિયંત્રણ માટે તેના શરીર પર મેલેથિયોન અથવા સાયપરમેશ્વિન @ ૩ મિ.લિ. પ્રતિ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. • પશુઓના શેડના હિનાઈલ ૫.૦ મિલી પ્રતિ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
પોષણ	<ul style="list-style-type: none"> • પશુઓની પૌષ્ટિક આવશ્યકતાને પૂરક બનાવવા માટે ૫૦ ગ્રામ ખનિજ મિશ્રણ પ્રતિદિન અન્ય ખોરાક સાથે મિશ્ર કરી આપવું.

વિષય નિષ્ણાંત
ફૂલ હવામાનશાસ્ત્ર



District Agrometeorological Unit (DAMU)
Gramin Krishi Mausam Seva (GKMS)
Krishi Vigyan Kendra
Junagadh Agricultural University
Amreli-365601
Phone: 02792-227122



Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department



Join our Telegram channel and block wise WhatsApp groups



Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 070(2023)

Date:05-09-2023

Significant weather of past week, Amreli

#	Parameter	30-08-23	31-08-23	01-09-23	02-09-23	03-09-23	04-09-23	05-09-23
1	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0	0	0
2	Max.Temp.(°C)	34.7	34.7	34.2	34.1	33.6	33.7	32.6
3	Min.Temp.(°C)	24.8	24.6	24.9	24.6	24.1	24.8	24.8
4	RH-I (%)	100	100	100	100	100	100	92
5	RH-II (%)	43	48	50	53	50	50	54
6	Wind Speed (kmph)	9.8	9.1	7.8	8.9	9.0	10.7	10.1
7	Total CC (octa) out of 8	1	2	3	0	2	1	2

Weather Forecast from 06/09/2023 to 10/09/2023

#	Parameter	06/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	09/09/2023	10/09/2023
1	Rainfall (mm)	1	2	8	3	5
2	Max.Temp.(°C)	35	35	34	34	32
3	Min.Temp.(°C)	25	25	25	26	25
4	RH-I (%)	84	77	79	81	85
5	RH-II (%)	48	42	44	48	56
6	Wind Speed (kmph)	17	21	23	24	23
7	Wind Direction(deg.)	283	292	292	288	288
8	Total CC (octa) out of 8	4	6	7	8	7

Note: Above forecast is the average situation of whole district

Agro-Advisory

Weather Summary

- The weather in Amreli District is likely to be warm, humid, and partly cloudy in next 5 days.
- The isolated light rainfall likely from 06 to 10 September over the district.

- The maximum temperature is likely to be **33-35 °C**. The minimum temperature is likely to be **25-26° C** in next five days.
- Wind direction likely from WNW **wind gust speed likely 17 to 23 km/h.**
- **Extended Range Forecast:** The weather of Saurashtra and Kutch is likely to be humid and partly cloudy from 11 to 15 September. The isolated light to moderate rainfall likely over the region in this week.

General Advisory

- Farmers are recommended to resowing of cluster bean, green gram, black gram, pigeon pea, Castor, Sesame (Purva), Pre-Rabi Onion, Pre Rabi-Pearl millet, Sun hemp for seed, and fodder crops like cluster bean, sorghum and sunflower.
- Due to the extended dry spell, apply life-saving irrigation through drip/sprinkler method.
- Use trichoderma spp. @ 2.5 kg/ha for control of soil bourne diseases, Cotton wilt, and stem rot and collar rot in groundnut.
- Remove weeds from the fields and use them for mulching to avoid water loss. Carry out hoeing or intercultural operations to make soil mulch to conserve soil moisture.
- Undertake foliar spray of nitrogen fertilizers and micronutrients as it improves the endurance of crop during drought like conditions.
- Spray Kaoline 4% solution i.e. 400 g/10 litres of water.
- If there is more infestation of disease drenching of Carbendazim 0.05% @ 10 g/10 lit. water.



- Keep organic waste or plastic mulch in crop to prevent loss of soil moisture and, weed control.
- To survey pink bollworm in cotton, install two pheromone traps (with lure) per acre, check the average 8 male adults per days trapped for 3 consecutive days, then spray neem seed kernel extract 5% or neem oil @ 50 ml per 10 litres of water.
- Apply neem seed kernel extract @ 750 g or Neem oil @ 45 ml in 15 lit of water to control sucking pests due to prevailing cloudy weather.

SMS Advisory:

- To control of pink bollworm in cotton install pheromone trap @ 40 per hectare and spray Beauveria bassiana @ 80 g per pump.

Crops	Crop Stage	Practices	Advisory
-------	------------	-----------	----------

Castor	Pre-sowing, Sowing and germination	Semilloper and spodoptera		Spray chlorantraniliprole 18.5 SC @ 3.0 ml or indoxacarb 14.5 SC
	@ 5.0 ml or emamectin benzoate 5 % WG @4.0 g or spinosad 45 SC @ 2.0 ml in 10 liters of water at an interval of 15 days for control of Semilooper and spodoptera.			
	Sucking pests			
Cotton	Vegetative to first square	Fertilizer		<ul style="list-style-type: none"> • apply spray of neem seed kernal powder 500 g or neem oil 50 ml in 10 litre of water at the initiation of the infestation. • Apply spray of flonicamid 50 WG @ 30 g or Diafenthiuron 50 WP 10 g or Dinotefuran 20 SG 3 g or Clothianidin 50 WDG 4 g or Fipronil 5 SC 20 ml or Acephate 50%+ Imidacloprid 1.8% SP 10 ml in 10 litre of water.
		Leaf miner		<ul style="list-style-type: none"> • Spray Spinosad 45 SC @ 3 ml or Cyantraniliprole 10 OD @ 20 ml in 10 liters of water for control of leaf miner.
		Growth enhancer		<ul style="list-style-type: none"> • Apply DAP @ 55 kg and MOP @ 125 kg / ha during ridge making. • Apply Ammonium sulphate 344 kg/ha in the third week after sowing.
		Sucking pests		<ul style="list-style-type: none"> • Apply naphthalene acetic acid 30 ppm (0.3 g/10 lit water) at 50 and 70 days after sowing to increase the yield by an increase in a number of chlorophylls, the thickness of leaves, squares, length of sympodia, and a number of bolls. • apply spray of neem seed kernal powder 500 g or neem oil 50 ml in 10 litre of water at the initiation of the infestation. • Apply spray of flonicamid 50 WG @ 30 g or Diafenthiuron 50 WP 10 g or Dinotefuran 20 SG 3 g or Clothianidin 50 WDG 4 g or Fipronil 5 SC 20 ml or Acephate 50%+ Imidacloprid 1.8% SP 10 ml in 10 litre of water.

	Pink Bollworm	  
		<ul style="list-style-type: none"> • To survey pink bollworm in cotton, install two pheromone traps (with lure) per acre, check the average 8 male adults per days trapped for 3 consecutive days, then spray neem seed kernel extract 5% or neem oil @ 50 ml per 10 litres of water.
	Angular leaf spot	
		<ul style="list-style-type: none"> • Spray streptomycin sulphate @ 1 g + copper oxychloride 50 WP @ 40 g in 10 liters of water.
	Root rot	
		<ul style="list-style-type: none"> • Mix Carbendazim 50 WP @ 10 gm or Copper Oxychloride 20 gm in 10 liters of water and apply in the root zone around the wilting plants.
	Sucking pests	<ul style="list-style-type: none"> • As per Castor sucking pests
Groundnut	Flowering to Pegging	<p>Tikka Disease/ Early leaf spot</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Spray Tebuconazole 10 ml/10 lit of to prevent leaf spot infestation.
	Yellowing of leaves	 <ul style="list-style-type: none"> • • Water logging condition causes iron deficiency in groundnut, and leaves turns into pale yellow, for this deficiency, spray ferrous sulphate @ 100 g and citric acid @ 10 g per 10 litre of water • If necessary, can 2nd spray @ intervals of 08 to 10 days. • Drainage, if there is a reach type soil. Interculturing practices can be made after rainfall break of 5 to 10 days and apply ammonium sulphate fertilizer.

		Collar rot	
		White grub	<ul style="list-style-type: none"> • Apply trichoderma spp. @ 2.5 kg with Castor cake @ 500 kg/ha. • If there is more infestation apply carbandazim 0.05% @ 15 g/pump as a drenching. 
Pearl Millet	Sowing	weed management	<ul style="list-style-type: none"> • Keep crop weed free for 45 days after sowing. Interculturing should be done two to three times to keep the crop weed free and maintain soil moisture.
	Fertilizer		<ul style="list-style-type: none"> • Potassium chloride at the rate of 1.5% (7.5 kg/ha dissolved in 500 liters of water) should be applied to monsoon millet farmers at 30-35 and 50-55 days after sowing for better vegetative growth, higher production, and net income.) to sprinkle.
		Leaf blast	<ul style="list-style-type: none"> • At the initiation of disease, apply spray Carbendazim 50 WP 10 g/10 liters of water, apply two sprays at 15-20 days of interval.
Sesame	Flowering and capsule formation	Curling of leaves	<ul style="list-style-type: none"> • Curling of leaves is caused by mite of leaf Webber, for control of mite spray Fenpyroximate 5EC @ 15 ml. Or control of leaf Webber and mite correspondingly spray thiodicarb 75 WP @ 15 g in 15 liters of water 

	Root and Stem rot	
	Phyllody	<ul style="list-style-type: none"> • drenching of Carbendazim 0.05% @ 10 g/10 lit. water.
	Leaf webber	<ul style="list-style-type: none"> • The disease is spread by jassids, remove the infected plants from the field and destroy or bury it, apply two spray of Dimethoate 30 % EC @ 10ml/10 litre of water at 10 days interval for the control of jassids.
Pigeon Pea	weed management	<ul style="list-style-type: none"> • Install light traps. • Apply spray of beauveria bassiana @ 40 g or neem see kernal powder @ 500 g in 10 litre of water. • Apply spray of quinalphos 25 EC @ 20 ml or Chlorpyriphos 20 EC @ 20 ml or acephate 75 SP @ 10 g in 10 litre of water.
Green Gram / Black Gram	Yellow mosaic virus	<ul style="list-style-type: none"> • Keep the field clean with Interculturing and weeding as required. If there is a shortage of farm labor, for chemical control, spray, pendimethlylene (stomp) 1 kg / ha by dissolving the active ingredient in 600 liters of water. Spray immediately after sowing before germination.
Sorghum	Anthracnose	<ul style="list-style-type: none"> • The disease is transmitted through whitefly, • Apply Dimethoate 30 EC @ 10 ml or Imidacloprid 17.8 SL @ 3 ml or Acetamiprid 20 SP @ 2 g or neem oil @ 40 ml in 10 litres of water.
	Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> • If sowing is not possible with the onset of rains, seed treatment with carbosulfan 25 EC @ 100 g per kilogram seed for control of shoot fly
	Weed management	<ul style="list-style-type: none"> • In addition, Seed treatment Thiram / Captan @ 3 g/kg, and Azotobacter or Azospirillum culture can also be given.

	Anthracnose	Apply two sprays of Carbendazim 50 WP @ 5 g/ 10 litre of water at 15 days of interval.	
Sugarcane	Crop Protection	<ul style="list-style-type: none"> To control aphids and whiteflies in sugarcane, spray 5% solution made from Neem seed @ 500 g of 10 liters of water. 	
Tomato	Leaf miner	  <ul style="list-style-type: none"> Spray Spinosad 45 SC @ 3 ml or Cyantraniliprole 10 OD @ 20 ml in 10 liters of water for control of leaf miner. 	
Brinjal	Leaf miner	<ul style="list-style-type: none"> Spray Spinosad 45 SC @ 3 ml or Cyantraniliprole 10 OD @ 20 ml in 10 liters of water for control of leaf miner. 	
Bottle guard	Leaf miner	<ul style="list-style-type: none"> Spray Spinosad 45 SC @ 3 ml or Cyantraniliprole 10 OD @ 20 ml in 10 liters of water for control of leaf miner. 	
Vegetable Crops	Transplanting	<ul style="list-style-type: none"> Carry out transplanting for tomato, chili, brinjal and early cauliflower those who have seedlings ready for T.P. To prevent soil borne disease drenching of nursery bed should be done with Mencozeb 75 % WP @ 2.5 gm/ litre of water after 15 DAS. 	
	Damping off		<ul style="list-style-type: none"> When the disease appears, spray azoxystrobin 23 SC @10 ml or fenamidone 10% + Mancozeb 20% WP 30 gm in 10 liters of water or drenching of metalaxyl MZ 68 WP @ 32 g in 200 liters of water per 100 square meter or apply bordeaux mixure @ 2 litre per square meter.
	Leaf curl		<ul style="list-style-type: none"> Pyriproxyfen 10 % EC @ 17 ml or Cyantraniliprole 10.26 % OD @ 18 mlin 10 litre of water
Lime 	Fruiting / flowering	Citrus Canker 	<ul style="list-style-type: none"> Apply four spray of Bordeaux mixture or copper-based fungicide in November, February, June, and July for the control of the citrus canker.
	Fruit dropping		<ul style="list-style-type: none"> Apply urea 2% with NAA 2 ppm during fruiting to decrease the quantity of fruit dropping.
	Gummosis		<ul style="list-style-type: none"> Pruning of branches attached to soil. Paste Bordeaux mixture on bark of the tree.

		<ul style="list-style-type: none"> • Drenching of metalaxyl MZ 72 WP @ 25 g/ 10 l water around bark of the tree
Psylla & thrips		<ul style="list-style-type: none"> • Remove and destroy infected trunks. • Apply to Spray neem seed kernel powder @ 500 g OR leaves of Neem OR Beauveria @ 1 kg OR Neem based insecticide 5 EC @ 10 ml in 10 litres of water at the initial stage of infection.
Lemon Butterfly		<ul style="list-style-type: none"> • Hand picking and destroy the larvae from the orchard. • Spray neem seed kernal extract 500 g (5%) in 10 liter water at intial stage of pest • If there is more infestation, Spray quinalphos 25 EC @ 20 ml/ 10 liter of water
Leaf miner		<ul style="list-style-type: none"> • Apply monocrotophos 0.05% @ 15 ml of Dimethoate 0.03% @ 15 ml in 10 lit of water @ 15 days of interval. If there is more infestation of whitefly, spray acetamiprid 20 SP @ 3 g in 10 lit. of water
Livestock 	Pest & disease	<ul style="list-style-type: none"> • To control of ectoparasites in cattle apply malathion or cypermethrin @ 3.0 ml/l of water on the body of cattles. • Spray phenyle @ 5.0 ml/l in floor of cattle shed. Close the window and doors with curtain.
	Feed	<ul style="list-style-type: none"> • Provide 50 gm mineral mixture per animal for supplemet the nutrient requirement.

**Subject Matter Specialist
Agrometeorology**

Click your block to join whatsapp group of DAMU

Amreli District	https://chat.whatsapp.com/LJHGr15dR3e7tcIALWDiw8
-----------------	---