



જીલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU)

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS)
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી
અમદેલી-૩૬૫૬૦૧
કોન નં. ૦૨૭૯૮૨ ૨૨૭૭૧૨૨



(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપત્તિ)

આનંદી
કા
અમૃત મહોત્સવ

#AmritMahotsav



અહીં ક્લિક કરી કૃષિ હવામાન બુલેટીન અંગે આપના પ્રતિભાવ અવશ્ય જણાવો



અમદેલી જીલ્લાના તાલુકાઓ મુજબની હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ માટે ટેલીગ્રામ અથવા



વોટ્સએપ ગુપમાં જોડાવા અંતિમ પેજની મુલાકાત લો

અમદેલી કૃષિ હવામાન બુલેટીન ક. ૦૩૭/૨૦૨૩

તા. ૦૬-૦૫-૨૦૨૩

પાછળા અઠવાડીયાનું અમદેલીનું હવામાન

	હવામાન પરિબળો	03-05-2023	04-05-2023	05-04-2023	06-05-2023	07-05-2023	08-05-2023	09-05-2023
૧	વરસાદ (મી.મી.)	0	18.5	0	7.5	0	0	0
૨	મહત્તમ તાપમાન (°સે.)	36.1	35.1	37.4	37.3	38.3	40.5	41.3
૩	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.)	23.5	24.1	23.8	25.2	25	25.8	25.8
૪	મહત્તમ ભેજ સવાર (%)	100	100	97	100	100	99	79
૫	લઘુત્તમ ભેજ બપોર (%)	35	42	32	19	28	22	21
૬	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	8.0	9.0	7.5	8.8	10.5	11.3	7.0
૭	પવનની ટિથા (ડિગ્રી)	93	111	95	93	90	99	310
		પૂર્વ	પૂર્વ અભિ	પૂર્વ	પૂર્વ	પૂર્વ	પૂર્વ	વાયવ્ય
૮	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો) માંથી	5	2	3	0	0	2	0

અમદેલી જીલ્લાની તા. 10/05/2023 થી 14/05/2023 ની હવામાન આગાહી:

#	હવામાન પરિબળો	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	14/05/2023
૧	વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
૨	મહત્તમ તાપમાન (°સે.)	43	44	44	43	42
૩	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.)	25	26	26	25	24
૪	મહત્તમ ભેજ સવાર (%)	37	31	32	53	73
૫	લઘુત્તમ ભેજ બપોર (%)	21	18	16	18	17
૬	પવનની ગતિ (કિ.મી./કલાક)	18	19	20	23	25
૭	પવનની ટિથા (ડિગ્રી)	326	315	302	292	283
		વાયવ્ય	વાયવ્ય	પશ્ચિમ વાયવ્ય	પશ્ચિમ વાયવ્ય	પશ્ચિમ વાયવ્ય
૮	વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો) માંથી	2	2	1	0	0

નોંધ: આ આગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નહિ.

કૃષિ સલાહ

હવામાન સારાંશ અમદેલી જીલ્લામાં આગામી ૫ દિવસ દરમિયાન હવામાન ગરમ, આંશિક ભેજવાળું અને આંશિક વાદળાંથી રહેવાની શક્યતા છે તેમજ હિટ વેવ રહેવાની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન ૪૨-૪૪ °સે અને લઘુત્તમ તાપમાન ૪૪-૪૬ °સે જેટલું રહેવાની શક્યતા છે.

પવનની ગતિ સામાન્ય કરતા વધુ, અંદાજીત ૧૮-૨૫ કિમી/કલાક સુધી ની રહેવાની શક્યતા છે, દિશા મોટાભાગે પણીમથી વાયવ્ય રહેવાની શક્યતા છે.

આગોઠણ અનુમાન: તા. ૧૫ થી ૧૬ મે ૨૦૨૩ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં હવમાન ગરમ, આંશિક બેજવાળું અને આંશિક વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. લઘુતમ તાપમાન ૨૪-૨૮ ° સે અને મહત્તમ તાપમાન ૩૮-૪૨ ° સે જેટલું રહેવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી.

સામાન્ય ફુલિયાં સલાહ	<ul style="list-style-type: none"> → ચોમાસું પાકોમાં સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થાપન માટે જમીનની ચકાસણી કરાવવી. → દુધાળા પશુઓને ગરનીની ઋતુમાં મિનરલ મિશ્રણમાં પોટેશીયમ અને સોડિયમ વધારે આપવું જોઈએ. → ભવિષ્યમાં પવનને કારણે નુકસાન ના થાય તે માટે ખેતર ફુરતે પવનરોધક વૃક્ષો જેવા કે નીલગીરી, સલુ વગેરે ઉગાડવા. → આકરા તાપમાં બાપોસના સમયે બહાર નીકળવું નહિ, પુષ્ટ પાણી પીવું, લસ્સી, છાશ, લીંબુ સરબત, મોસંબી તથા અન્ય ફુળનું જ્યુસ પીવું, હલકા સુતરાઉ કપડા પહેરવા અને માથા પર સફેદ ટોપી પહેરવી. → પશુઓને બાપોસના સમયે વૃક્ષોના છાયામાં અથવા શેડમાં રાખવા. → આ ગરમ હવમાન પરિસ્થિતિમાં ઉનાળું શાકભાજુ અને ઘાસચારાના પાડોને સવારે અથવા સાંજના સમયે જરૂરીયાતા મુજબ હળવું પિયત આપવું, શાકભાજુ અને ફળ પાડોને પ્લાસ્ટિક અથવા ખેત આપેદાશના અવશેષોનું આવરણ કરવું. → શિયાળું પાકની કાપણી પછી ઊડી ખેડ કરવી અને જમીનને સૂર્યના તાપમાં તપવા દેવી જેથી જીવાતોના ઈડા અને કોશોટાનો તેમજ રોગકારક ફૂગા અને જીવાણુંનો નાશ થાય.
SMS	<ul style="list-style-type: none"> → પશુઓને મે માસના અંતમાં ગળસુંઢો તથા ગાંઠીયા તાવની રસી મુકાવવી.

પાક મુજબ ફુલિયાં સલાહ

પાક	પાક અવસ્થા	કામગીરી / જત / રોગ / જીવાત	ફુલિયાં સલાહ
ચોમાસું પાકો	-	જમીન ચકાસણી	<p>આકૃતિ-૧ : બેસરના વિસ્તાર મુજબ જમીનના નમૂના લેવાના સ્થળ નક્કી કરવા.</p>
			<p>આકૃતિ-૨ : જમીનનો નમૂનો લેવાની રીત</p>

જમીન ચકાસણી એ ખેત આચોજનનું ખૂબ મહત્વનું પાસું છે, પાકો વાયા પહેલા પોતાની જમીનની ચકાસણી કરાવી.

- જમીનનો નમૂનો લેવા માટે જમીન પર કોઢાળી કે ખુરૂપીથી V આકાસો રૂપ સેમી ઊડી ખાડો કરવો. ખાડાની એક બાજુએથી ૨ થી ૩ સેમી જાડાઈનો થર આફ્ટિ ૨ મુજબ નમૂના માટે લેવો, આ રીતે ૮ થી ૧૦ જગ્યાએથી પ્રતી હેક્ટર માટી લઇ બરાબર મિશ્ર કરી એક કિલોગ્રામ માટી ચકાસણી માટે તૈયાર કરવી, અને નજીકની જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળામાં આપવા.

સરગવો	શીંગો પૂરી થવી	છટણી	<ul style="list-style-type: none"> • સરગવાની શીંગો પૂરી થવા બાદ કે મે-જૂનમાં ૩૦-૪૫ સે. મી. ટોચની ડાળીઓ કાપવી. • સરગવાના વૃક્ષો પ્રુનિંગ કરી (૨ મીટર ઊંચાઈ) ટીંગણા રાખવા જેથી શીંગો ઉતારવામાં અને અન્ય ખેતી કાર્યોની સરળતા રહે.
કપાસ	પૂર્વ તૈયારી	જમીન વ્યવસ્થાપન	<ul style="list-style-type: none"> • જમીનને ખેડ કરી સમતલ બનાવો ડાળ ઓછી કરો અને આ માસમાં છાંડીયું (કમ્પોસ્ટ) ખાતર ચાસમાં ભરી દેવું. • કપાસનું આગોઠણ વાવેતર કરવું નહિ. તેમજ વાવેતર પહેલાં જમીનની ચકાસણી કરાવો.
ગુલાબી ઈયળ			<ul style="list-style-type: none"> • ઉનાળમાં ઊડી ખેડ કરવી

			<ul style="list-style-type: none"> સમયસર કપાસ વીળી લઈ તેમાં વેટા-બકરાં અને ઢોરને ચરાવવા કરાંઠીઓને દુંગણીનો ઉપયોગ કરી ભૂકી બનાવી સેન્ટ્રિય ખાતર બનાવવામાં ઉપયોગ કરવો. ખેતર અને તેની આસપાસમાં ગેમેલા કપાસના છોડ એકત્ર કરી નાશ કરવો. જુનીગ મીલની અંદર અને બહારથી નકામા કચરાનો ઘોગ રીતે નાશ કરવો.
તલ (ઉનાળુ)	વૃદ્ધિ થી ફૂલ	પિયત	<ul style="list-style-type: none"> તલના પાકને બીજા પિયત વખતે પાણી ઓછુ આપવું આ સમયે તલના છોડ નાના હોય છે. અને વધુ પાણીના લીધે છોડ બની જવાની શક્યતા રહે છે. પ્રથમ પિયત વાવેતર બાદ તુરંત અને વાવેતરના છ દિવસ બાદ બીજુ પિયત આપવું. ફૂલ ૮ થી ૧૦ પિયત પાકની વૃદ્ધિની અવસ્થા, જીવનની પરત અને હવામાન પરિસ્થિતિ મુજબ ૮ થી ૧૦ દિવસના અંતરે આપવા.
	પર્ણગુણ		<ul style="list-style-type: none"> રોગની અસરવાળા પાન ફીનારી નીચેની બાજુ ઢળી જઈ કોકડાઈ જાય છે. જેથી તેને પાનનો કોકડવા પણ કરે છે. ફૂલ બેસવા સમયે ફૂલનું પાનમાં રૂપાંતર થઈ જવાના કારણે પાનનો ગુંજું બને છે. જેથી બૌઢા બેસતા નથી. આ રોગ લીલા તડતરીયા ફૂલાતો હોય છે. તેના નિયત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૧૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો. રોગીએ છોડને ઉપાડી નાશ કરવો.
મગ-અડન (ઉનાળુ)	ફૂલ અવસ્થા થી બૈના	મોલો-મશી અને સફેદ માખી	<ul style="list-style-type: none"> વીભોળીના મીજનો ભૂકો ૫૦ ગ્રામ (૫% અર્ડ્ક) અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર કોટનાશક ૧૦ મીલી (૫ ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. ઉનાળુ તલ પણ તેમજ ઘાટા પીળા પડી જાય પછી કાપણી કરી, ઉભડા કરવા તે પછી સુકાઈ જાય પછી ખેરી તલનું ગ્રેડીંગ કરી કોથળા ભરી લેવા.
	વૃદ્ધિ	પાક સંરક્ષણ	<ul style="list-style-type: none"> અડનાં પાનના ટપકાના રોગના અસરકારક અને અર્દક્ષમ નિયત્રણ માટે રોગથી શકુઆત હેકાક્સિનાઝોલ ૦.૦૦૫૪% (૧૦ લિટર પાણીમાં ૧૦ મિલી) ના ત્રણ છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવા. સફેદ માખી અને લીલા તડતરીયાના નિયત્રણ માટે ગલગોટાનું વાવેતર કરવું. આ જીવાતો છોડમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરી હોવાથી તેની નિયત્રણ માટે શોષક, પ્રકારની જંતુનાશક દવા જેવી કે ડાયમીથોએટ ૩૦% ઇસી ૩૦ મિલી અથવા મીથાઈલ ઓ ડીમેટોન ૪૦% ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
	મોલોમશી, તડતરીયા અને સફેદ માખી		<ul style="list-style-type: none"> વીભોળીના મીજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ડ્ક) અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર કોટનાશક ૧૦ મીલી (૫ ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો.
	કાપણી		<ul style="list-style-type: none"> મગની શીંગોની કાપણી વહેલી સવારે કરવી.
બાજરી (ઉનાળુ)	થૂલી અવસ્થા- દાણા ભરાવાની અવસ્થા	પિયત	<ul style="list-style-type: none"> સામાન્ય રીતે ગોરાળુ જીવનમાં બાજરીના પાકને ૬ થી ૭ પિયત ૧૨ થી ૧૫ દિવસના અંતરે આપવા. પિયતની કટોકટી અવસ્થાઓ: અંકુર અવસ્થાઓ(૩-૫ દિવસ), ફૂટ અવસ્થા(૨૧-૩૫ દિવસ), નીઘલ અવસ્થા(૪૫-૬૫ દિવસ), થૂલી અવસ્થા(૫૫-૭૫ દિવસ) અને દાણા ભરાવાની અવસ્થા(૭૦-૮૦ દિવસ)
	લીલી ઈયળ		<ul style="list-style-type: none"> બાજરીમાં લીલી ઈયળના નિયત્રણ માટે ઉપક્રમની શકુઆતમાં વીભોળીના મીજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા બ્યુનેરીયા બેસીયાના ફૂન્ઝો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ અથવા HaNPV ૨૫૦ ઈયળ એકમ ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો.
	કુતુલ / તળાણો		<ul style="list-style-type: none"> ઉભા પાકમાં રોગ જણાય તો મેટાલેક્શીલ એમ્ઝેડ ૧૫ ગ્રામ / ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગળી છંટકાવ કરવો. રોગીસ્ટ છોડનો નાશ કરવો.
			<ul style="list-style-type: none"> બાજરીનાં તુંડાને દબાવાથી દાણા છુટા પડે ત્યારે લણવા.
જીવાર	પિયત		<ul style="list-style-type: none"> દાણાની જુવાર માં દુધિયા દાણાની અવસ્થાએ લેજની ખેંચ જણાય ત્યારે પિયતની સગવડ હોય તો પૂર્ક પિયત આપવું.

આંબો	આખડી થી પરિપક્વ ફળ	આશાદન/ આવરણ/ મલ્લોંગ/ લીલો પડવાશ	<ul style="list-style-type: none"> જાડ ઉપર કેરી હોય ત્યારે ખૂલ્લી જમીનનો તડકો ન લાગે તે માટે કઈ આસ્થાદન કરવું અથવા મગ/ગુવાર/શાશ ઉગાડી અંબાવાડીયામાં ભેજ જાળવવો અને કેરી પાક પુરો થયા બાદ તેનો લીલો પડવાશ કરી નાખવો જેથી કેરીમાં કપાસીનો (સ્પોન્જ ટિશ્યૂ) રોગ નિવારી શકાય અને અન્ય કેરીમાં ફળ ઉપર સૂર્ય ગરમીથી પડતા ડાધા અટકાવી શકાય.
ભૂકિ છારો			<ul style="list-style-type: none"> કૂલો દરમિયાન ભૂકી છારાના નિયંત્રણ માટે વેટેબલ સલ્ફર ૮૦ ટકા દવાનો ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૨૫૦ ગ્રામ ભેજવીને છંટકાવ કરવો.
શેરડી	પાક સંરક્ષણ		<ul style="list-style-type: none"> કેરી ઉત્તરતા પહેલા ૧૫ દિવસે ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ કેલ્વિયમ કલોરાઇઝનો છંટકાવ કરવાથી બગાડ અટકાવી શકાય પરિપક્વ કેરી ૧ સે.મી. લંબાઈદાર ઠીંટા સાથે પ્લાસ્ટિકના કેરેટમાં ઉતારવી. કેરીને તરત છાંયદે લઈ જવી. કદ, રંગ અને પરિપક્વતા પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરી એક ઘરમાં ઉંધી હારમાં પાથરતા ક્ષીર સુકાઈ જાય છે.
દાડમ			<ul style="list-style-type: none"> શેરડીમાં તહતીયા અને સહેદ માપીના નિયંત્રણ માટે લીબોળી માંથી બનાવેલ ૫% દ્રાવણ પ્રમાણ ૧૦ લિટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો. દાડમની પેતીમાં ગાંધાયા ઇમિનું નિયંત્રણ માટે દાડમની પેતી કરતા ખેડૂતોને ગાંધાયા કૃમિના અસરકારક અને અર્થક્ષમ નિયંત્રણ માટે પેસીલીયોમાયસીસ લીલારીનિસ (૨ ૧૦ બીજાણું/ગ્રામ) ૨૦ કિ.ગ્ર./હે+ દિવેલી ખોળ ૨ ટન/ડે. ચોમાસાની શરૂઆતમાં અને ત્યારબાદ દર ક માસના અંતરે થડવી ૧૨ થી ૧૮ દિન દુર તથા આશરે ૬ દિન ઊંડી રીંગ કરીને જમીનમાં મૂળની નજીક આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
લીંબુ	ફળ અવસ્થા/ ફૂલ અવસ્થા	બળિયા ટપકા	  <ul style="list-style-type: none"> બળિયા ટપકા ના નિયંત્રણ માટે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર, હેલ્લુઆરી-માર્ચ, જુન અને જુલાઈ-ઓગસ્ટ માં એમ કુલ ચાર વખત ૧૦:૦૫:૧૦૦ ના પ્રમાણ વાળું બોર્ડો મિશ્રણ અથવા તાંબા યુક્ત દવાનો છંટકાવ કરવો.
	ફળ ખરી જવા		<ul style="list-style-type: none"> લીંબુ ના ફળો બેસી ગયા બાદ ૨% યુરિયા સાથે ૨૦ ppm NAA ના ૧-૨ છંટકાવ કરવાથી ફળ નું ખરણ ધારે છે અને ફળ ના કાળ અને વજન માં વધારો થાય છે.
	ગુંડસિયો		<ul style="list-style-type: none"> જમીનને અડકતી ડાળીઓની છાટણી કરી બાળી નાખવી. થડને પાણીનો સીધો સંપર્ક ન થાય તે માટે થડ પર બોર્ડો પેસ્ટ (મોરથુથુ ૧ કિ.ગ્ર., કળીચૂનો ૧ કિ.ગ્ર. ૧૦ લિટર પાણીમાં) લગાવી થડની ફુરતે માટી ચડાવવી. અસરગ્રસ્ત ઝાડના થડ ફુરતે મેટાલેક્સિલ એમઝેડ ૭૨ વેપા (૨૫ ગ્રામ/૧૦ લિટર) નું ટ્રેચીંગ કરવું.
	સાચલા		<ul style="list-style-type: none"> ઉપદ્રવિત અને સુધી ડાળીઓ કાપતા રેહવું. ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીંબોળીના મીજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડા / નફટટીયાના પાન ૧ ડિલોગ્રામ અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર કરેલ ક્રિટનાશક ૫ ઇસ્ટી - ૧૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.
મગફળી (ઉનાળી)	ફૂલ અવસ્થા	પિયત	<ul style="list-style-type: none"> ગીજુ પિયત ૨૦ થી ૨૫ દિવસે છોડ ઉપર ફૂલ દેખાય ત્યારે આપવું, અને ગીજુ પિયત ૩૦ થી ૩૫ દિવસે સુચા બેસતી વખતે આપવું.
શેંગણ	ફળનો વિકાસ	સહેદ માપી	<ul style="list-style-type: none"> જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે ઉનાળું મગફળીને ઉપાડી ઢગલા અછવાડીયું સુકાયા બાદ, પાથરા ફેરવી, તોડવામાં ૮ ટકા ભેજ હોય ત્યારે ગ્રેસિંગ કરવું. શેંગણી અને ટામેટોમાં સહેદ માપીના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ દવાને ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.



ટામેટો

પશુપાલન



ટુંબ અને
કળ કોરી ખાનાર
ઈયળ

પાન કથીરી

લધુપણી

• કળ અને તોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ કળ અને તોકા તોડીને જમીનમાં દાંઠી દેવા અને કલોરાનદ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (શીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.

• રીંગણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા ઈસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.

• રોગ તહતીયાંથી ફેલાતો હોવાથી રોપણી પણી ૧૦ થી ૧૫ દિવસે કાર્બોક્ષ્યૂરાન ૩ જી ૧ ડિ.ગ્રા. સ.તત્વ/હે. પ્રમાણે છોડની ફરતે રીંગ પદ્ધતિથી આપવું અને ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા થાયોમેથોકઝામ રૂપ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળીને વારાફરતી જરૂર પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.

વિષય નિષ્ણાંત
કૃષિ હવામાનશાસ્ત્ર



કૃષિ વિદ્યાન કેન્દ્ર અમદેલી દ્વારા બનાવવામાં આવેલા અમદેલી જુલ્લાના
હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ અંગેના તાલુકા મુજબના વોટ્સઅપ
ગુપમાં જોડાવા માટે તમારા તાલુકા પર ક્રિકિટ કરો.



જુલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU), ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS), કૃષિ વિદ્યાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી,
અમદેલી-૩૬૫૬૦૧, કોન નં. ૦૨૭૯૮૨ ૨૨૭૧૨૨

અમદેલી જુલ્લો

<https://chat.whatsapp.com/JAWfIDrsNIgKE1Z2EYAkMq>



District Agrometeorological Unit (DAMU)
Gramin Krishi Mausam Seva (GKMS)
Krishi Vigyan Kendra
Junagadh Agricultural University
Amreli-365601
Phone: 02792-227122



Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department

આનંદી
કા
અમૃત મહોત્સવ
#AmritMahotsav



Join our Telegram channel and block wise WhatsApp groups



Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 038(2023)

Date:09-05-2023

Significant weather of past week, Amreli

#	Parameter	03-05-2023	04-05-2023	05-05-2023	06-05-2023	07-05-2023	08-05-2023	09-05-2023
1	Rainfall (mm)	0	18.5	0	7.5	0	0	0
2	Max.Temp.(°C)	36.1	35.1	37.4	37.3	38.3	40.5	41.3
3	Min.Temp.(°C)	23.5	24.1	23.8	25.2	25	25.8	25.8
4	RH-I (%)	100	100	97	100	100	99	79
5	RH-II (%)	35	42	32	19	28	22	21
6	Wind Speed (kmph)	8.0	9.0	7.5	8.8	10.5	11.3	7.0
7	Wind Direction(deg.)	93	111	95	93	90	99	310
		E	ESE	E	E	E	E	NW
8	Total CC (octa) out of 8	5	2	3	0	0	2	0

Weather Forecast from 10/05/2023 to 14/05/2023

#	Parameter	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	13/05/2023	14/05/2023
1	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
2	Max.Temp.(°C)	43	44	44	43	42
3	Min.Temp.(°C)	25	26	26	25	24
4	RH-I (%)	37	31	32	53	73
5	RH-II (%)	21	18	16	18	17
6	Wind Speed (kmph)	18	19	20	23	25
7	Wind Direction(deg.)	326	315	302	292	283
		NW	NW	WNW	WNW	WNW
8	Total CC (octa) out of 8	2	2	1	0	0

Note: Above forecast is the average situation of whole district

Agro-Advisory

Weather Summary

- The weather in Amreli District is likely to be Warm, moderate humid, and partly cloudy in next 5 days. No probability of rainfall. The heatwave is likely prevailing in next five days. The minimum temperature is likely to be **24-26 °C**. The maximum temperature is likely to be **42-44 °C** in next five days.



- Wind direction likely from NW to WNW with gusts of 18 to 25 km/h.
- Extended Range Forecast:** The weather of Saurastra and kutch likely to be warm, dry and clear sky from 15 to 19 may. No probability of rainfall from. Minimum temperature remains 24-28, and maximum temperature likely to be 38-42 °C in forecast period.

General Advisory

- Do soil testing for the Integrate nutrient management in Kharif crops.
- Give more potassium & sodium in mineral mixture to animals during summer season.
- Plantation and grow windbreaks trees on border to prevent loss by the high winds.
- Avoid heat exposure and drinks plenty of water, ORS and fruit juices like lemon water, butter milk etc. b. Wear light weight, light coloured, loose cotton clothes. Cover your head with white cap. Keep the animal under tree shade or shed during noon hours.
- Due to prevailing dry and hot weather conditions, farmers are advised to apply light & frequent irrigation in all vegetable and fodder crops in the morning hours or in the evening hours.
- Carry out mulching in wide space vegetable crops.
- Deep ploughing of fields after harvesting of rabi crops is advised so that eggs and pupating stages of insects, fungus, bacteria and weed seeds will destroy under high temperature.

SMS Advisory:

- Vaccination against HS and BQ disease at the end of May.

Crops	Crop Stage	Practices	Advisory
Kharif Crops	-	Soil Testing	  <p>આકૃતિ-૧: ગેતરના વિસ્તાર મુજબ જમીનના નમૂના લેવાના રીતની ચારી ઓશન.</p> <p>આકૃતિ-૨: જમીનનો નમૂનો લેવાની રીત.</p> <ul style="list-style-type: none"> Make 25 cm of V shape in soil by farm implement, take 2 to 3 cm of layer from the deep soil. Take this type of sample from 8 to 10 spot from 1 hectare in reference to figure-1 and well mixed it and use 1 kg soil for the soil testing.
Drumstick	After Harvest	Prunning	<ul style="list-style-type: none"> Pruning to be done from 30 to 45 cm of top branches after completion of harvesting in drumstick in May-June. Pruning of drumstick trees (2 m height) to keep them small so as to facilitate harvesting of pods and other farming activities.

Cotton	Mitigation	Land Preparation	<ul style="list-style-type: none"> • Plough the land and level it. Reduce the slope. • Apply compost in the furrow in this month.
		Pink bollworm	<ul style="list-style-type: none"> • Timely picking of the cotton and after that graze sheep, goats and cattle in cotton field. • Make organic fertilizer of stalk of the cotton • Remove and destroy the undesired plants of cotton in and around the field.
Sesame (Summer)	Vegetative Stage to Flowering	Irrigation	<ul style="list-style-type: none"> • Apply 2nd Irrigation as a light irrigation, at this time plants have very less height and it may be died due to water lagging. • The second irrigation should be given immediately after sowing and the second irrigation should be given six days after sowing. • Apply total of 8 to 10 irrigation at intervals of 8 to 10 days depending on the growth stage, type of soil and weather conditions.
		Phyllody	<ul style="list-style-type: none"> • The diseased leaf bends downwards and becomes Curled. So it is also called a leaf curl. The bunch of leaves is formed as the flower transforms into a leaf at the time of flowering. So that the flower do not set. The disease is spread by jassids. Apply dimethoate 10 ml in 10 litres of water for its control. Collect and destroy infected plants.
Green gram Black gram	Flowering to Capsule	Aphid and Whitefly	<ul style="list-style-type: none"> • Spray Neem seed kernel Extract 5 EC @ 10 ml / 10 liter of water.
		Crop protection	<ul style="list-style-type: none"> • For effective and efficient control of leaf spot disease, three sprays of Hexaconazole 0.005% (10 ml in 10 liter of water) should be sprayed at an interval of 15 days. • Growing intercrops such as marigold for the control of blister beetle, whitefly and leaf hoppers. • Apply systemic insecticides like Dimethoate 0.03% or Methyl-O-Dimeton 0.04% in water for control.
Pearl Millet	Boot stage to grain filling stage	Aphid and Whitefly	<ul style="list-style-type: none"> • Spray Neem seed kernel Extract 5 EC @ 10 ml / 10 liter of water.
		Harvesting	<ul style="list-style-type: none"> • Picking pods early in the morning.
		Irrigation	<ul style="list-style-type: none"> • Apply 6 to 7 irrigation generally in sandy loam soil at 12 to 15 days of intervals. • Critical Stages for the irrigation: Germination stage (3-5 days), Tillering stage (21-35 days), Boot leaf stage (45-65 days), Flowering stage (55-75 days) and Grain filling stage (70-90 days).

	Heliothis		<ul style="list-style-type: none"> Apply Spray of Neem seed Kernel powder @ 500 g OR Beauveria Bassiana @ 60 g OR HaNPV 250 LI @ 10 ml in 10 litres of water at the initial condition of pest.
	Downy mildew		<ul style="list-style-type: none"> Apply Spray of metalaxyl MZ @ 15 g / 10 liter water.
Sorghum	Irrigation		<ul style="list-style-type: none"> Harvesting the crop when the seeds are released by pressing the earheads. In Fodder grain if there is a shortage of moisture in the case of milky grains, supplementary irrigation should be given.
Mango	Green manuring/ Spongy tissue /Mulching		<ul style="list-style-type: none"> Cover the open ground or sowing Green gram/cluster bean / sunn-hemp to maintain moisture in the soil of mango orchard and use it as in-situ green manuring after completion of mango crop when there is Fruit on the tree to prevent sponge tissue disease. And in other mangoes, the stains from the sun heat on the fruit can be prevented.
	Powdery mildew		<ul style="list-style-type: none"> Apply spray of wettable sulphur @ 250g/100 L water to control powdery mildew during flowering.
	Harvesting		<ul style="list-style-type: none"> Apply Spray of CaCl2 before 15 days of Harvesting of fruits to prevent diseases in mangos. Harvest the Matured Mango with 1 cm of fruit stalk in plastic crates. Keep harvested Mango in shade Grading of fruits according to size, colour and maturity and then arrange the fruit in inverse position to dry out the sap of fruit stalk
Sugarcane			<ul style="list-style-type: none"> To control aphids and whiteflies in sugarcane, spray 5% solution made from Neem seed @ 500 g of 10 liters of water.
Pomegranate			<ul style="list-style-type: none"> For effective and efficient control of nematodes, it is recommended to make a ring 12 to 18 inches away from the trunk and about 9 inches deep near the roots in the soil and apply Paecilomyces lilacinus 20 kg/ha at the beginning of monsoon and thereafter at intervals of every 6 months.
Lime	Fruiting	Citrus Canker 	<ul style="list-style-type: none"> Apply four spray of Bordeaux mixture or copper-based fungicide in November, February, June and July for the control of the citrus canker.

	Fruit dropping		<ul style="list-style-type: none"> Apply urea 2% with NAA 2 ppm during fruiting to decrease the quantity of fruit dropping.
	Gummosis		<ul style="list-style-type: none"> Pruning of branches attached to soil. Paste Bordeaux mixture on bark of the tree. Drenching of metalaxyl MZ 72 WP @ 25 g/ 10 l water around bark of the tree
	Psylla & thrips		<ul style="list-style-type: none"> Remove and destroy infected trunks. Apply to Spray neem seed kernel powder @ 500 g OR leaves of Neem OR Beauveria @ 1 kg OR Neem based insecticide 5 EC @ 10 ml in 10 litres of water at the initial stage of infection.
Groundnut Summer 	Flowering	Irrigation	<ul style="list-style-type: none"> first irrigated provide immediately after the planting. The second irrigation should be given on 20 to 25 days at the time of the initiation of flowering, and the third irrigation should be given on 30 to 35 days at pegging stage. <p>• pull out the summer groundnuts When the soil is moist after the heaps have dried for a week, turn the beds, and threshing when there is 8% moisture in the soil.</p>
Brinjal & Tomato 	Fruit Development Fruit Development	Sucking pest Shoot & Fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water. In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml 10 litre of water is advised.
	Mites		<ul style="list-style-type: none"> If infestation of mite is observed in brinjal, then spraying of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water.
	Little leaf		<ul style="list-style-type: none"> Apply Carbofuran 3g @ 1 kg a.i./ha around the plant by ring method due to the disease is transmitted through jassids. Also, apply a spray of dimethoate 30 EC @ 10 ml or thiamethoxam 25 WG @ 4 gm at 10 to 12 days of intervals.
Livestock 			<ul style="list-style-type: none"> Vaccination against HS and BQ disease at the end of May. Deworming should be given to chicks around 6 months of age and other adult animals.

-
- Give bypass protein to cow to increase the milk production and fat.
 - Give more potassium & sodium in mineral mixture during summer season.
-

**Subject Matter Specialist
Agrometeorology**

Click your block to join whatsapp group of DAMU

Amreli District	https://chat.whatsapp.com/JAWfIDrsNIgKE1Z2EYAkMq
--------------------	---